



FARA
Missstänks kunna orsaka cancer.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 Innehåller propakizafop. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.
 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 Framkalla INTE kräkning.
 För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen

Verksamt ämne: Propakizafop 100 g/L (9,6 vikt-%)

Övrigt ämne av betydelse för klassificering och märkning:
 solventnaffa (tung aromatisk)

Formulering: Emulgerbart koncentrat (EC)

Parellelhandelstillstånd nr: PHT-0035-5232

Ursprungsprodukt Agil 100 EC, reg nr: 396-12

Användarkategori: 2 L

Verkningsmekanism: HRAC A

Net innehåll: 5 L

Distributör: Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S, Danmark.

Tel 0771-24 48 10

Registreringshållare: ADAMA Registrations B.V.

P.O.Box 355, NL-3830 GK Leusden, Nederländerna

Reg. - Användarkategori 2 L.

Användningsområden

Mot gräsgräs i odlingar av äpple, päron, hallon, krusbär, vinbär och jordgubbar på friland.

Mot gräsgräs i odlingar av potatis, morot, kålrot, kepalök, silverlök, schalottenlök och vitlök.

Mot gräsgräs i odlingar av senap, lin och raps.

Mot gräsgräs i odlingar av broccoli och huvudkål.

Mot gräsgräs i odlingar av ärtor och bönor.

Mot gräsgräs i utsädesodlingar av klöver och rödsvingel.

Mot gräsgräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.

Mot gräsgräs i etablerade odlingar i plantskolor och skogsplantskolor.

Avfall: Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinnings-system (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se).

Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur.

Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning



5 707239 501760

BRUKSANVISNING
GODKÄND ANVÄNDNING

Zetrola® är godkänd för användning mot gräsgräs enligt nedanstående tabell:

Gröda	Syfte	Behandling				Max dos/tillfälle L/ha	Behandlings-metod	Bemärk
		Utvecklings- stadium (BBCH)/ säsong	Karens-tid (dygn)	Max. antal beh /år	Behandlings- intervall (dygn)			
Äpple och päron	Mot gräsgräs	april-september	30	2	14-28	1,5	Bomspruta	Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Hallon, krusbär, vinbär	Mot gräsgräs	maj-juli	35	1		1,5	Bomspruta	
Jordgubbar	Mot gräsgräs	Före blomning samt efter skörd	35	1		1,5	Bomspruta	
Potatis	Mot gräsgräs	< 68	30	1		1,5	Bomspruta	Får inte användas i odlingar av färskpotatis
Morot	Mot gräsgräs	< 40	30	2	14-28	1,5	Bomspruta	Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Senap	Mot gräsgräs	Före blomning		1		1,5	Bomspruta	
Kålrot	Mot gräsgräs	< 40	30	1		1,5	Bomspruta	
Kepalök, silverlök, schalottenlök, och vitlök	Mot gräsgräs	< 45	30	2	14-28	1,5	Bomspruta	Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Broccoli och huvudkål	Mot gräsgräs		30	2	14-28	1,5	Bomspruta	Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.

Gröda	Syfte	Behandling				Max dos/tillfälle L/ha	Behandlings-metod	Bemärk
		Utvecklings- stadium (BBCH)/ säsong	Karens-tid (dygn)	Max. antal beh /år	Behandlings- intervall (dygn)			
Färska örter samt torkade örter och bönor	Mot gräsogräs	<59	45	1		1,5	Bomspruta	
Lin	Mot gräsogräs	9-20 cm		1		1,5	Bomspruta	Restmaterial efter oljeextraktion får gå till foder
Våraps	Mot gräsogräs	< 39		2	14-28	1,5	Bomspruta	Restmaterial efter oljeextraktion får gå till foder Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Höstraps	Mot gräsogräs	< 50		2	14-28	1,5	Bomspruta	Restmaterial efter oljeextraktion får gå till foder Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Sockerbetor, foderbetor och rödbetor	Mot gräsogräs	< 32		2	14-28	1,5	Bomspruta	Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Klöverfrö och rödsvingelfrö	Mot gräsogräs	< 49	45	1		1,5	Bomspruta	
Etablerade odlingar i plantskolor och skogsplantskolor	Mot gräsogräs	maj-juli		1		1,5	Bomspruta	

Restriktioner

Zetrol® som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar och kan anses som mycket säkert att använda.

Skyddsavstånd

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

GRÖDOR, DOSERING OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Kontrollera effekten genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 m² i fältet.

Vattenmängd: 75-300 l/ha

Gröda	Skadegörare	Dos, L/ha	Tidpunkt, Utvecklingsstadium på grödan	Observera
Äpple och päron	Kvickrot	1,25-1,5	april –september	Delad behandling med 2-4 veckors intervall. Karenstid 30 dygn. Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Äpple och päron	Spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,6-0,8	april - september	Delad behandling med 2-4 veckors intervall. Karenstid 30 dygn. Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Hallon, krusbär, Vinbär,	Kvickrot	1,25-1,5	maj - juli	Karenstid 35 dygn.
Hallon, krusbär, Vinbär,	Spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,6-0,8	maj - juli	Karenstid 35 dygn.
Jordgubbar	Kvickrot	1,25-1,5	Före blomning samt efter skörd	Karenstid 35 dygn.
Jordgubbar	Spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,5-1,0	Före blomning samt efter skörd	Karenstid 35 dygn.
Potatis	Kvickrot	0,75-1,5	DC 10-68	Karenstid 30 dygn. Får inte användas i odlingar av färskpotatis.
Potatis	Spillsäd, ettåriga, gräsartade ogräs, flyghavre	0,5-1,0	DC 10-68	Karenstid 30 dygn. Får inte användas i odlingar av färskpotatis.
Morot, kålrot	Kvickrot	1,25-1,5	DC 10-40	Karenstid 30 dygn.
Morot, kålrot	Spillsäd, ettåriga, gräsartade ogräs, flyghavre	0,5-1,0	DC 10-40	Karenstid 30 dygn.
Morot	Kvickrot, spillsäd, ettåriga, gräsartade ogräs, flyghavre	0,75 + 0,75	DC 10-40	Delad behandling med 2-4 veckors intervall. Karenstid 30 dygn. Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Senap	Kvickrot	1,25-1,5	Före blomning	
Senap	Spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,6-0,8	Före blomning	

Gröda	Skadegörare	Dos, L/ha	Tidpunkt, Utvecklingsstadium på grödan	Observera
Kepalök, silverlök, schalottenlök, och vitlök	Kvickrot	1,25-1,5	DC 10-45	Karenstid 30 dygn.
Kepalök, silverlök, schalottenlök, och vitlök	Spillsäd, ettåriga, gräsartade ogräs, flyghavre	0,5-1,0	DC 10-45	Karenstid 30 dygn.
Kepalök, silverlök, schalottenlök, och vitlök	Kvickrot, spillsäd, ettåriga, gräsartade ogräs, flyghavre	0,75 + 0,75	DC 10-45	Delad behandling med 2-4 veckors intervall. Karenstid 30 dygn. Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Broccoli och huvudkål	Kvickrot	1,25-1,5	> DC 10	Karenstid 30 dygn.
Broccoli och huvudkål	Spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,5-1,0	> DC 10	Karenstid 30 dygn.
Broccoli och huvudkål	Kvickrot, spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,75-1,0 + 0,75-1,0	> DC 10	Delad behandling med 2-4 veckors intervall. Karenstid 30 dygn. Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Färska örter samt torkade örter och bönor	Kvickrot	0,75-1,5	DC 10-59	Karenstid 45 dygn.
Färska örter samt torkade örter och bönor	Spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,5-1,0	DC10-59	Karenstid 45 dygn.
Lin	Kvickrot	1,25-1,5	9-20 cm	Restmaterial efter oljeextraktion får gå till foder.
Lin	Spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,5-1,0	9-20 cm	Restmaterial efter oljeextraktion får gå till foder.
Vårrops	Kvickrot	0,75-1,5	DC 10-39	Restmaterial efter oljeextraktion får gå till foder.
Vårrops	Spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,5-1,0	DC 10-39	Restmaterial efter oljeextraktion får gå till foder.
Vårrops	Kvickrot, spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,75+0,75	DC 10-39	Restmaterial efter oljeextraktion får gå till foder. Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Höstraps	Kvickrot	0,75-1,5	DC 10-50	Restmaterial efter oljeextraktion får gå till foder.

Gröda	Skadegörare	Dos, L/ha	Tidpunkt, Utvecklingsstadium på grödan	Observera
Höstraps	Spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,5-1,0 1,5 L på våren	DC 10-50	Restmaterial efter oljeextraktion får gå till foder.
Höstraps	Kvickrot, spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,75+0,75	DC 10-50	Restmaterial efter oljeextraktion får gå till foder. Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Sockerbetor, foderbetor, rödbetor	Kvickrot	0,75-1,5	DC 10-32	
Sockerbetor, foderbetor, rödbetor	Spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,5-1,0	DC 10-32	
Sockerbetor, foderbetor, rödbetor	Kvickrot, spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,75+0,75	DC 10-32	Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt per hektar och år.
Klöverfrö och rödsvingelfrö	Kvickrot	1,25-1,5	DC 10-49	Karenstid 45 dygn.
Klöverfrö och rödsvingelfrö	Spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,6-0,8	DC 10-49	Karenstid 45 dygn.
Etablerade odlingar i plantskolor och skogsplantskolor	Kvickrot	1,0-1,5	Maj-juli	
Etablerade odlingar i plantskolor och skogsplantskolor	Spillsäd, ettåriga gräsartade ogräs, flyghavre	0,6-0,8	Maj-juli	

Den lägsta givna dosen rekommenderas endast i speciellt för bekämpningen gynnsamma förhållanden; vid varmt och fuktigt väder (luftens relativa fuktighet över 70 %), då växtbeståndet är i god tillväxt.

OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN

Kvickrot

Vid engångsbehandling sprutas odlingen då kvickroten är på 4-6 bladsstadiet och är 20-30 cm hög. Vid delad behandling utförs den första behandlingen då kvickroten är på 3-5 bladsstadiet, den andra behandlingen utförs ca tre veckor senare, sockerbetsodlingar behandlas innan beståndet sluter sig. På odlingar av fleråriga växter, såsom äppleträd, bärbuskar och i plantskolor, infaller den rätta behandlingstidpunkten från mitten av maj till början av juni, då kvickroten är på 4-6 bladsstadiet. Jordgubbar behandlas, med plantorna skyddade, helst strax före blomningen (obs. karenstid 35 dygn), då uppnås den bästa effekten mot kvickrot, eller alternativt som bredsprutning strax efter skörd.

Flyghavre

Vid bekämpning av flyghavre utförs behandlingen då flyghavren är i slutet av bestockningen eller senast i början av stråskjutningen.

För sockerbetor rekommenderas inte tankblandningar med andra ogräspreparat på grund av att effekten försämras.

Anmärkningar:

Farligt för gräsartade odlingsväxter. Hårdigheten hos alla prydnadsträd och -buskar i olika växtförhållanden kan inte garanteras, varför det är skäl att testa preparatet på ett litet område.

Gräsartade ogräs dör inom 2–3 veckor. Har ingen effekt mot örtogräs.

Sockerbetor kan behandlas med andra bekämpningsmedel senast tre dagar före eller tre dagar efter en behandling med Zetrola®.

Effekten mot kvickrot försvagas om myllning eller hackning utförs inom tio dygn före eller efter behandlingen.

Vid delad behandling i sockerbetor kan effekten mot kvickrot vara sämre i kyliga förhållanden. Gröda som lider av torka, köld eller annan stress får inte behandlas.

VERKNINGSSÄTT OCH VERKNINGSMEKANISM

Zetrola® är en systemiskt verkande herbicid. Produkten tas upp genom blad och rötter och sprids därefter i plantan.

Zetrola® bekämpar en rad gräsogräs såsom kvickrot, spillsäd, flyghavre, rajgräs, ängsgröe, kärrgröe, renkavle och åkerven. Effekten av vitgröe kan variera betydligt, bäst effekt uppnås när vitgröen har 1-3 blad och ännu inte bildat tuva.

Effekten inträder efter 3 - 5 dagar då gräsens tillväxt stannar. Första synliga effekten, i form av gul- och/eller rödfärgning av bladen, syns 10 - 14 dagar efter behandling. Efter ytterligare 3 - 8 dagar uppnås en nedvissning.

TANKBLANDING

För att komplettera effekten kan Zetrola® tankblandas med ogräspreparaten, Matrigon 72 SG, Goltix® 700 SC eller Betanal Power. Vid insektsangrepp kan Zetrola® blandas med Mavrik®.

Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

BEHANDLINGSTEKNIK, RENGÖRING MM

Personlig skyddsutrustning

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar (kemikaliebeständig nitril eller neopren) och ögonskydd användas.

Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset

Beredning av sprutvätskan

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Håll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
- Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprut- vätska får ingen vätska komma ut i avlopp, vattendrag eller vattentäkt. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

Rengöring av sprututrustning

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt. Börja med invändig rengöring av sprutan:

1. Töm sprutan
2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
7. Fyll på med en sista tredjedel vatten
8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvändig rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

Avfall och tomemballager

Förpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. Rengjorda förpackningar lämnas till SvegReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral.

Syngenta är anslutet till SvegRetur tel 0370-173 85 samt till REPA tel 0200-88 03 10. Preparatrest, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är farligt avfall och lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

Tom förpackning får inte återanvändas.

OMSÅDD, EFTERFÖLJANDE GRÖDOR

Inga restriktioner.

RESISTENS

Resistens visar sig genom dålig eller bristande effekt vid behandling. Ingen resistens mot propakizafop har påvisats i Sverige, men var uppmärksam om oväntat dåliga effekter mot normalt känsliga ogräs fås. Detta gäller speciellt renkavle.

Zetrola® och dess verksamma substans propakizafop (HRAC grupp 1) har samma verkningsätt som Select (aktiv substans kletodim) och Focus Ultra (aktiv substans cykloksidim), men tillhör en egen kemisk familj.

För att undvika uppkomst av resistens, var noggrann med följande:

- Använd produkter med olika verkningsätt i växtföljden
- Kör under optimala förhållanden
- Anpassa doseringen efter situation (väder, ogrässtorlek)
- Använd den bästa spruttekniken

OPBEVARING

Lagras frostfritt samt åtskilt från födoämnen och utsäde.

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning.

Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och an- dra användningssätt kan påverka produktens effekt. Företaget frångår sig ansvar i dessa avseenden.

Företaget frångår sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.

För mer information om produkten se vår hemsida www.syngenta.se

Syngentas allmänna rekommendationer för säker användning av växtskyddsmedel



Läs mer på
zero-impact.syngenta.se



Användning av avdriftsreducerande munstycken = **Minimering av avdrift och avdunstning**

Använd bästa tillgängliga sprutteknik för att minimera risken för avdrift från fältet.



Säker rengöring av sprututrustning = **Inga onödiga skador på andra grödor eller miljön**

Resterna av bekämpningsmedel i tanken spåds ut 1-100 gånger och sprutas över den behandlade grödan.

Efteråt rengörs spruta, munstycken och bom på fältet eller på tvättområdet.



Bra bo- och matplatser för insekter i naturen = **Ökad biologisk mångfald**

Se till att det inte sker avdrift eller spill i naturen när du gödslar eller besprutar – till exempel genom att hålla avstånd.



Inga bin = **Ingen pollinering**

Bin och andra pollinatörer kan skyddas från växtskyddsprodukter som är skadliga för dem genom att spruta vid tidpunkter på dygnet då pollinatörer inte befinner sig i fält, eller spruta enbart i fält där ingen blommande vegetation förekommer.



Ansvarsfull användning av produkter = **Ökad säkerhet**

God hygien och användning av lämplig säkerhetsutrustning skyddar dig och din omgivning.

Läs alltid etiketten innan användning och följ den. Var uppmärksam på varningar och symboler.

Good Growth Plan | **syngenta**.

Registrerade varumärken

Syngenta Group Company: Zetrola® (R).

Goltix® 700 SC - ADAMA Quena N.V. Galera® -Dow Agrosciences LCC

Betanal® Power – Bayer CropScience AG

Mavrik® – ADAMA Invita N.V.


FARA

Misstänks kunna orsaka cancer.

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller propakizafop. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Framkalla INTE kräkning.

För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen

**UN3082
ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(PROPAQUIZAFOP AND
SOLVENT NAPHTHA)**

Verksamt ämne: Propakizafop 100 g/L (9,6 vikt-%)

Övrigt ämne av betydelse för klassificering och märkning:
solventnфта (tung aromatisk)

Formulering: Emulgerbart koncentrat (EC)

Parellelhandelstillstånd nr: PHT-0035-5232

Ursprungsprodukt Agil 100 EC, reg nr: 396-12

Användarkategori: 2 L

Verkningsmekanism: HRAC A

Net innehåll: 5 L

Distributör: Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S, Danmark.

Tel 0771-24 48 10

Registreringshållare: ADAMA Registrations B.V.

P.O.Box 355, NL-3830 GK Leusden, Nederländerna

Reg. - Användarkategori 2 L.

Användningsområden

Mot gräsgräs i odlingar av äpple, päron, hallon, krusbär, vinbär och jordgubbar på friland.

Mot gräsgräs i odlingar av potatis, morot, kålrot, kepalök, silverlök, schalottenlök och vitlök.

Mot gräsgräs i odlingar av senap, lin och raps.

Mot gräsgräs i odlingar av broccoli och huvudkål.

Mot gräsgräs i odlingar av ärtor och bönor.

Mot gräsgräs i utsädesodlingar av klöver och rödsvingel.

Mot gräsgräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.

Mot gräsgräs i etablerade odlingar i plantskolor och skogsplantskolor.

Avfall: Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinnings-system (tel: 0370-173 85 eller www.svegretur.se).

Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur.

Rester, spill och ej rengjord tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning



5 707239 501760

