

Blandningstabell AXIAL ONE

OGRÄSMEDEL	
Alliance	Risk för antagonism när flyghavre är målogräset. Max 40 g Diflufenikan per ha i tankblandning. Observera ökad risk för vittfärgning av grödan vid behandling med Diflufenikan.
Ariane S	Viss risk för nedsatt effekt mot flyghavre vid blandning med produkter innehållande MCPA. Rekommenderas ej då högsta krav ställs på behandlingseffekten mot flyghavre vid tuffa förhållanden. Max 1,5 l Ariane S per ha.
Atlantis OD	Risk för antagonism när flyghavre är målogräset. När åkerven är målogräs är blandning ok.
Attribut SG 70	
Broadway	
Biathlon 4D	
CDQ SX	Risk för antagonism när flyghavre är målogräset. När åkerven är målogräs är blandning ok.
Cleave	
Duplosan-D	Viss risk för nedsatt effekt mot flyghavre vid blandning med produkter innehållande 2,4-D. Rekommenderas ej då högsta krav ställs på behandlingseffekten mot flyghavre vid tuffa förhållanden. Max 0,25 l Duplosan-D per ha.
Ergon	Risk för antagonism när flyghavre är målogräset. När åkerven är målogräs är blandning ok.
Express 50 SX	
Flurostar 200	
Harmony Plus 50 SX	
Hussar Plus OD	X Hög risk för antagonism
Kinvara	Viss risk för nedsatt effekt mot flyghavre vid blandning med produkter innehållande MCPA. Rekommenderas ej då högsta krav ställs på behandlingseffekten mot flyghavre vid tuffa förhållanden. Max 1,3 l Kinvara per ha.
Legacy 500 SC	Max 40 g Diflufenikan per ha i tankblandning. Observera ökad risk för vittfärgning av grödan vid behandling med Diflufenikan.
MCPA	Viss risk för nedsatt effekt mot flyghavre vid blandning med produkter innehållande MCPA. Rekommenderas ej då högsta krav ställs på behandlingseffekten mot flyghavre vid tuffa förhållanden. Max 0,5 l MCPA per ha.
Mustang	Viss risk för nedsatt effekt mot flyghavre vid blandning med produkter innehållande 2,4-D. Rekommenderas ej då högsta krav ställs på behandlingseffekten mot flyghavre vid tuffa förhållanden. Max 0,4 l Mustang per ha.
Mustang Forte	Viss risk för nedsatt effekt mot flyghavre vid blandning med produkter innehållande 2,4-D. Rekommenderas ej då högsta krav ställs på behandlingseffekten mot flyghavre vid tuffa förhållanden. Max 0,7 l Mustang Forte per ha.
Nautius	
Nuance	
Pixxaro	
Primus/Saracen	
Primus XL	
Quelex	
Ratio Super SX	
Saracen Delta	Max 40 g Diflufenikan per ha i tankblandning. Observera ökad risk för vittfärgning av grödan vid behandling med Diflufenikan.
Sekator OD	X Hög risk för antagonism
Spitfire 333HL	
Starane 333HL	
Starane XL	
Tomahawk 200 EC	
Trimmer 50 SG	
Trimmer 500 WG	
Tripali	Risk för antagonism när flyghavre är målogräset. När åkerven är målogräs är blandning ok.
Tombo	
Zypar	

TILLVÄXTREGLERINGSMEDEL

BASF Cycocel Plus	
Cerone	
MODDEVO	
MODDUS® START	
Stabilan	
Terpal	

INSEKTSMEDEL

Inga kända blandbarhetsproblem med insekticider. Kontakta alltid tillverkaren av det aktuella medlet för mer information.

SVAMPMEDEL

Amistar	
Elatus Era	
Elatus Plus	
Kayak	
Pecari 300	
Plexeo 90	

BLADGÖDSELMEDEL INNEHÅLLANDE SVABEL I FORM AV MANGASULFAT, AMMONIUMTIOSULFAT ELLER AMMONIUMSULFAT-SALPETER

Bladgödselmedel innehållande svavel i form av mangasulfat, ammoniumtiosulfat eller ammoniumsulfat-salpeter

Flytande kvävegödselmedel såsom urea eller flytande ammoniumkväve



- Blandbar enligt nuvarande kunskap
- Blandbar med risk för något nedsatt behandlingseffekt mot gräsgräsen. Om behandlingarna utförs efter varandra skall ett avstånd på minst 7 dagar mellan behandlingarna hållas.
- På grund av hög risk för skadlig påverkan på grödan skall följande produkter aldrig tankblandas med AXIAL ONE. Vidare bör ett intervall på minst 10 dygn mellan behandling med AXIAL ONE och de följande produkterna hållas för att undgå risk för skadlig påverkan på grödan.
- Tillsatsmedel som normalt krävs för fullgod effekt av produkten skall ej användas vid tankblandning med minst 0,6 l/ha AXIAL ONE.

Syngenta avråder från tankblandning med mer än en växtskyddsprodukt åt gången. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

Syngenta garanterar inte att alla produkterna ovan kan tankblandas fysikalskt eller är säkra för grödan under alla förekommande förhållanden som orsakas av exempelvis varierande vattenkvalitet, vattentemperaturer, väder, sorter etc.

Tillsätt alltid fasta produkter först i spruttkan.

Påbörja spridningen av sprutvätskan så snart tankblandningen är klar. Håll sprutvätskan i kontinuerlig omrörning tills arbetet är avslutat.

Produkterna ovan är registrerade varumärken hos

Bayer	Attribut SG 70, Atlantis OD, Sekator OD, Hussar Plus OD, Cerone
BASF	Biathlon, Cycocel Plus, Medax Max, Terpal
Adama	Cleave, Legacy, Trimmer 500 WG, Trimmer 50 SG, Tomahawk 200
FMC	CDQ, Express, Harmony Plus 50SX, Tripali
Nufarm	Alliance, Duplosan D, MCPA, Saracen, Saracen Delta, Nuance, Stabilan
Corteva	Ariane S, Mustang, Mustang Forte, Primus, Primus XL, Spitfire 333HL, Starane 333HL, Starane XL, Zypar, Broadway, Tombo, Quelex, Pixxaro
Nordisk Alkali	Kinvara, Egon, Flurostar 200, Nautius