



syngenta®

INSEKTICID

GROUP 3A INSECTICIDE

INSEKTICID

Mot insektsangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre, lin, raps, rybs, potatis, ärtor, bönor, huvudkål, brysselkål, blomkål och broccoli.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs alltid etikett och bruksanvisning noggrant före användning.

Detta växtskyddsmedel får endast tillhandahållas till distributörer och yrkesmässiga användare som har ett giltigt utbildningsbevis.



Läs Syngentas allmänna rekommendationer för säker användning av växtskyddsmedel.
www.zero-impact.syngenta.se

Läs alltid etiketten innan användning och följ den.
Var uppmärksam på varningar och symboler.

1 L

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company



UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(TAU-FLUVALINATE)

VARNING

EUH401

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Mot insektsangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre, lin, raps, rybs, potatis, ärtor, bönor, huvudkål, brysselkål, blomkål och broccoli.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält.

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

SP1

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.

Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

INSEKTICID

Reg nr. PHT- 0036- 4491 Behörighetsklass 2L Endast för yrkesmässigt bruk

Beredningsform: Emulsion, olja i vatten

Innehåller: tau-fluvalinat 240 g/L (26,1 vikt-%)

Net innehåll: 1 L

Distributör: Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tel + 45 32 87 11 00

Registreringshållare: ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355, NL 3830 AK Leusden



5 707239 501722

BRUKSANVISNING
GODKENDT ANVENDELSE

Mot insektsangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre, lin, raps, rybs, potatis, ärtor, bönor, huvudkål, brysselkål, blomkål och broccoli. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Behandling får i stråsäd ej ske senare än 30 dagar före skörd.

Behandling får i lin, raps och rybs ej ske senare än 60 dagar före skörd.

Behandling får i Ärtor och bönor ej ske senare än 14 dagar före skörd.

Behandling får i potatis, färska ärtor och kål ej ske senare än 7 dagar före skörd.

Skyddsavstånd

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Vid spridning i huvudkål, brysselkål, blomkål och broccoli användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 90%.

GRÖDOR, DOSERING OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Behandla vid begynnande angrepp när bekämpningströskeln är uppnådd. Dosen anpassas efter grödans utveckling och tillväxthastighet samt eftersträvd långtidsverkan av behandlingen. Vid behandling av grödor i tidiga utvecklingsstadier med snabb tillväxt kan en delad eller upprepad behandling vara motiverad för att skydda nyttillväxta delar av grödan.

Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Kontrollera effekten genom att lämna en yta på minst 25 m² i fältet.

GRÖDA	SKADEGÖRARE	DOSERING (l/ha)	Tidspunkt (BBCH)	ANMÄRKNING
Stråsäd	Jordloppa	0,15-0,20	10-12	Vattenmängd: 100-400 L/ha
Vete	Randig dvärgstrit	0,20	Höstvete: 10-11 Vårvete: 10-31	max 1 applicering på hösten och 2 appliceringar på våren Vattenmängd: 100-400 L/ha
Stråsäd	Bladlöss	0,075-0,20	10-75	Använd hög dos om långtidseffekt önskas Vattenmängd: 100-400 L/ha
Stråsäd	Sädesbladbagge	0,15-0,20	31-49	Bekämpa innan flagblad angrips Vattenmängd: 100-400 L/ha

GRÖDA	SKADEGÖRARE	DOSERING (l/ha)	Tidspunkt (BBCH)	ANMÄRKNING
Vete och korn	Sadelgallmygga	0,20	37-49	Vattenmängd: 100-400 L/ha
Stråsäd	Trips	0,15-0,20	39-59	DC 55 för lilla sädestripsen Vattenmängd: 100-400 L/ha
Vete och rågvete	Vetemygga	0,15-0,20	Gul vetemygga: 47-55 Röd vetemygga: 47-61	Vattenmängd: 100-400 L/ha
Oljeväxter	Rapsjordloppa	0,15-0,20	Från uppkomst (DC 10) till DC 12	Vattenmängd: 100-300 L/ha
Raps och rybs	Rapsbaggar	0,20	51-59	Växla preparat med olika verkningsmekanism Vattenmängd: 100-300 L/ha
Raps och rybs	Blygrå rapsvivel och skidgallmygga	0,20	60-71	Vattenmängd: 100-300 L/ha
Raps och rybs	Rapsvivel	0,20		Vattenmängd: 100-300 L/ha
Raps och rybs	Kålbladstekel	0,20	10-15	Vattenmängd: 100-300 L/ha
Raps och rybs	Kålbladlus	0,20		Vattenmängd: 100-300 L/ha
Ärtor	Ärtvivel och Trips	0,15-0,20	10-79 Vid angrepp	Vattenmängd: 100-300 L/ha
Ärtor	Bladlus	0,15-0,20	31-69	Vattenmängd: 100-300 L/ha
Ärtor	Ärtvecklare	0,15-0,20	Vid begynnande baljsättning (70-79)	Vattenmängd: 100-300 L/ha
Torkade bönor	Bönbladlus	0,15-0,20	50-79	Vattenmängd: 100-300 L/ha
Potatis	Koloradoskalbagge, bladlöss, stritar, stinkflyn och trips	0,10-0,20	12-49 Vid angrepp	Vattenmängd: 100-400 L/ha
Blomkål och broccoli	Rapsbagge och kålbladlus	0,20-0,30	10-49	Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 90% Vattenmängd: 200-400 L/ha
Huvudkål och brysselkål	kålbladlus	0,20-0,30	10-49	Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 90% Vattenmängd: 200-400 L/ha

OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN

En jämn och god täckning av grödan är en förutsättning för fullgod effekt. Optimal effekt uppnås när:

- Skadeinsekterna är aktiva och sitter exponerade
- Skadeinsekterna befinner sig i ett känsligt stadie
- Regnfri tid efter behandling minst 2 timmar

VERKNINGSSÄTT OCH VERKNINGSMEKANISM

Evure® Neo är en bredverkande insekticid som samtidigt är skonsam mot en rad nyttoinsekter såsom bin och jordlöpare, parasitsteklar, blomflugor, stinksländor och vuxna nyckelpigor. Den verksamma beståndsdel heter tau-fluvalinat och är en kontaktverkande syntetisk pyretroid som snabbt tas upp i plantans vaxlager. Produkten är UV-stabil och kan således sprutas även under soliga förhållanden.

När skadeinsekten får i sig preparatet blockeras den spänningssensitiva Na⁺-kanalen i insektens nervmembran och förhindrar elektrontransporten. Detta leder till påverkan på nervsystemet vilket innebär förlamning och därefter död.

TANKBLANDING

Vid blandning med borprodukter skall 200 liter vatten användas och Evure® Neo blandas först väl ut i 90% av vattenmängden. Därefter tillsätts borprodukten. Blanda ej med Photrel! Störst risk för utfällning vid höga pH-värden på vattnet.

Tankblandningen utsprutas omedelbart efter tillredning.

Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

BEHANDLINGSTEKNIK, RENGÖRING MM

Sprutning skall ske under förhållanden som inte ger upphov till vindavdrift. Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lant- bruksspruta med bom". Sprutan skall vara funktionstestad och rätt kalibrerad för bästa resultat.

Skyddsutrustning

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

- Följ allmänna hygienåtgärder genom att:
- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset

Beredning av sprutvätskan

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
- Skaka dunken
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Håll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
- Tillsätt resterande vatten under fortsatt omrörning

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller vattentäcker. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Fyll tanken till hälften med vatten. Tillsätt preparaten var för sig och resten av vattnet under omrörning. Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete. Använd alltid skyddsutrustning vid hantering av koncentrerat preparat och sprutvätska. Koncentrerat preparat eller sprutvätska får under inga omständigheter komma ut i avlopp, åar eller vattentäcker.

Rengöring av sprututrustning

1. Rengör sprututrustningen ut- och invändigt omedelbart efter användning med rent vatten i fält.
2. Skölj tanken invändigt med rent vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning, t ex All Clear™ Extra. Spruta ut sköljvattnet i fält. Läs alltid produktens bruksanvisning före användning.
3. Skölj sprututrustningen med vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning. Slangar, munstycken, ventiler och filter skall genomsköljas och tanken skall stå under omrörning i minst 25 minuter. Filter och munstycken rengörs också separat i vatten med tillsats av medel avsett för rengöring av sprututrustning. Denna rengöring bör ske på säker plats, t ex biobädd eller behandlad mark/gröda. Sköljvattnet får under inga omständigheter förorena avlopp, brunnar, åar, dammar etc.

Avfall och tomemballage

Förpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. Rengjorda förpackningar lämnas till SvegReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Syngenta är anslutet till SvegRetur tel 0370-173 85 samt till REPA tel 0200-88 03 10. Preparatrest, sköljvattnet och ej rengjorda förpackningar är farligt avfall och lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Tom förpackning får inte återanvändas.

OMSÅDD, EFTERFÖLJANDE GRÖDOR

Inga restriktioner.

RESISTENS

Tau-fluvalinat, den aktiva substansen i Evure® Neo, tillhör den kemiska gruppen pyretroider, IRAC MoA grupp 3. Resistens visar sig genom dålig eller bristande effekt vid behandling. En utbredd resistens mot vissa pyretroider, men inte Evure® Neo, finns hos rapsbaggar i Sverige.

För att undvika uppkomst av resistens, var noggrann med följande:

- Följ bekämpningströsklarna
- Utför bekämpningen under optimala förhållanden
- Vid upprepad behandling bör en produkt med annat verknings sätt användas
- Använd den bästa spruttekniken

OPBEVARING

Frostfrit

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning. Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användnings-sätt kan påverka produktens effekt. Företaget fråntar sig ansvar i dessa avseenden. Företaget fråntar sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.

För mer information om produkten se vår hemsida www.syngenta.se

Syngentas allmänna rekommendationer för säker användning av växtskyddsmedel



Läs mer på
zero-impact.syngenta.se



Användning av avdriftsreducerande munstycken = Minimering av avdrift och avdunstning
Använd bästa tillgängliga sprutteknik för att minimera risken för avdrift från fältet.



Säker rengöring av sprututrustning = Inga onödiga skador på andra grödor eller miljön
Resterna av bekämpningsmedel i tanken spås ut 1:100 gånger och sprutas över den behandlade grödan. Efteråt rengörs spruta, munstycken och borm på fältet eller på tvättområdet.



Bra bo- och matplatser för insekter i naturen = Ökad biologisk mångfald
Se till att det inte sker avdrift eller spill i naturen när du gödslar eller besprutar – till exempel genom att hålla avstånd.



Inga bin = Ingen pollinering
Bin och andra pollinatörer kan skyddas från växtskyddsprodukter som är skadliga för dem genom att spruta vid tidpunkter på dygnet då pollinatörer inte befinner sig i fält, eller spruta enbart i fält där ingen blommande vegetation förekommer.



Ansvarsfull användning av produkter = Ökad säkerhet
God hygien och användning av lämplig säkerhetsutrustning skyddar dig och din omgivning.

Läs alltid etiketten innan användning och följ den. Var uppmärksam på varningar och symboler.

Good Growth Plan | **syngenta**.

Registrerade varumärken
Syngenta Group Company: Evure®



syngenta.

INSEKTICID

GROUP 3A INSECTICIDE

INSEKTICID

Mot insektsangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre, lin, raps, rybs, potatis, ärtor, bönor, huvudkål, brysselkål, blomkål och broccoli.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs alltid etikett och bruksanvisning noggrant före användning.

Detta växtskyddsmedel får endast tillhandahållas till distributörer och yrkesmässiga användare som har ett giltigt utbildningsbevis.



Läs Syngentas allmänna rekommendationer för säker användning av växtskyddsmedel.
www.zero-impact.syngenta.se

Läs alltid etiketten innan användning och följ den.
Var uppmärksam på varningar och symboler.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 L



UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(TAU-FLUVALINATE)

VARNING

EUH401

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Mot insektsangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre, lin, raps, rybs, potatis, ärtor, bönor, huvudkål, brysselkål, blomkål och broccoli.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält.

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

SP1

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.

Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

INSEKTICID

Reg nr. PHT- 0036- 4491 Behörighetsklass 2L Endast för yrkesmässigt bruk

Beredningsform: Emulsion, olja i vatten

Innehåller: tau-fluvalinat 240 g/L (26,1 vikt-%)

Net innehåll: 1 L

Distributör: Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tel + 45 32 87 11 00

Registreringshållare: ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355, NL 3830 AK Leusden



5 707239 501722

