

Potatisbladmögel

Strategi och rekommendation



syngenta®

För varningstext och varningssymboler, läs etiketten
eller gå in på www.syngenta.se.
Medlem av Svenskt Växtskydd

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
DK-2300 København S Danmark
www.syngenta.se

TM

Bladmögel är en aggressiv sjukdom som kräver en riktad insats för att kunna bekämpas.

Vid kemisk bekämpning mot bladmögel på potatis finns det en risk att bladmögelsvamparna utvecklar resistens. Risken är störst vid upprepad användning av medel med samma verkningsmekanism mot bladmögelsvampen. Samtidigt, när antalet verkningsmekanismer som är tillgängliga är begränsat, finns det ett behov av ytterligare fokus på bladmögelområdet.

Goda råd och förebyggande åtgärder mot bladmögel:

- Avlägsna smittkällor (avfallspotatis, spillpotatis).
- Ha en god växtföljd.
- Använd frisk sättpotatis.
- Välj motståndskraftiga sorter.
- Säkerställ en bra bekämpning av nattskatta.
- Följ varningar om bladmögel i ditt område.
- Säkerställ snabb torkning efter skörd.
- Ha en bra sprutteknik och använd vinklade munstycken med andriffsreduktion och gärna 200 liter vatten/ha.

Bidrar till att minska det generella smittrycket

Rekommendationer vid kemisk bekämpning

- Blanda medel med olika verkningsmekanismer mot potatisbladmögel vid varje behandling.
- Växla mellan blandningar som innehåller minst en annan aktiv substans med en annan verkningsmekanism mot bladmögel under hela växtodlingssäsongen.
- Tänk igenom hela säsongen – före varje behandling – och överväg hur du får bästa effekt av den enskilda produkten och blandningen.
- Uppnå den starkaste resistensstrategin med ett samlat program som innehåller alla godkända verkningsmekanismer.
- En förebyggande strategi ger det bästa skyddet.
- Var inte för sen med den första sprutningen mot bladmögel.
- Följ varningar om bladmögel.
- Följ väderprognosen och var uppmärksam på väder som är gynnsamt för bladmögel.

Hela året och säsongen



Syngenta rekommenderar **Evagio Plus.**

Evagio Plus som har inbyggd resistensstrategi med två verkningsmekanismer mot bladmögel.

Syngenta rekommenderar att blanda **Revus och Revus Top med Raport eller Banjo 500 SC.**

Kombinationen av dessa produkter ger en stark lösning som kompletterar varandra.

Banjo 500 SC och **Raport** är, liksom **Revus**, förebyggande medel som skyddar plantan i 7 dagar och har hög effekt mot EU43.

Revus har en mycket hög effekt mot alla andra potatisblad-mögeltypen inklusive EU37, där man i flera länder i Europa sett en minskad effekt mot **Banjo 500 SC**.



- Färdig blandning med två verkningsmekanismer mot potatisbladmögel
- Utmärkt resistensstrategi
- Ger utmärkt kontroll av bladmögel och brunröta
- Kombination av hög trans-laminär och kontaktverkande effekt
- Säkerställer ett effektivt skydd av nytillväxt
- 7 dagars karenstid

Rekommenderad dosering är:
0,6 l/ha

Evagio Plus rekommenderas som förebyggande behandling mot potatisbladmögel i potatisodlingar. Den kan med fördel användas tidigt mot både jord- och bladsmitta, i en fas av tidig tillväxt, samt efter knölbildning mot knölsmita.

Evagio Plus är en kombination av mandipropamid och amisulbrom, vars effekter kompletterar varandra väl och ger potatisodlaren ett gott skydd mot både bladmögel och brunröta under hela säsongen.



- Skyddar både ovansidan och undersidan av bladet (trans laminär effekt)
- Skyddar nytillväxt
- Verksam mot groning av sporer (antisporulerande)
- Regnfast efter en timme
- 3 dagars karenstid

Rekommenderas att användas med effektiv en blandningspartner, till exempel Raport eller Banjo 500 SC:

0,45 l/ha – 0,6 l/ha Revus + 1,1 l/ha – 1,4 l/ha Raport

0,45 l/ha – 0,6 l/ha Revus + 0,3 l/ha – 0,4 l/ha Banjo 500 SC

Båda blandningarna är en bra lösning mot bladmögel och resistensutveckling. De lägre doseringarna kan användas i perioder med lågt smittryck.




- Samma effekt mot bladmögel som Revus
- Dessutom bra effekt mot torrfläcksjuka (Alternaria)
- 3 dagars karenstid

Rekommenderas att användas med en effektiv blandningspartner, till exempel Raport eller Banjo 500 SC:

0,6 l/ha Revus Top + 1,1 l/ha – 1,4 l/ha Raport

0,6 l/ha Revus Top + 0,3 l/ha – 0,4 l/ha Banjo 500 SC

Båda blandningarna är bra lösningar för att hantera bladmögel, torrfläcksjuka och resistensutveckling. Bedöm smittrycket och blanda sedan.



Raport®

- Systemiskt medel
- Antisporulerande effekt
- 7 dagars effekt
- 14 dagars karens

Ska alltid blandas med en partner som har bra effekt mot potatis-bladmögel, som till exempel Revus eller Revus Top:

0,45 l/ha – 0,6 l/ha Revus + 1,1 l/ha – 1,4 l/ha Rapport är en bra lösning mot bladmögel och resistensutveckling.

0,6 l/ha Revus Top + 1,1 l/ha – 1,4 l/ha Rapport är en bra lösning för att hantera bladmögel, torrfläcksjuka och resistensutveckling.

De lägre doseringarna kan användas i perioder med lågt smittryck. Bedöm smittrycket och blanda sen.

Banjo® 500 SC

- Kontaktverkande medel
- Förhindrar bladmögelsporer att gro på bladen och minskar sporbildning
- God effekt på knölsmitta
- Regnfast när sprutvätskan torkat in (1-2 timmar)
- 7 dagars effekt (5-10 dagar beroende på väder)
- 7 dagars karens

Rekommenderas att användas med en effektiv blandningspartner, till exempel Revus och Revus Top:

0,45 l/ha – 0,6 l/ha Revus + 0,3 l/ha – 0,4 l/ha Banjo 500 SC är en bra lösning mot bladmögel och resistensutveckling. Den lägre doseringen kan användas i perioder med lågt smittryck.

6 l/ha Revus Top + 0,3 l/ha – 0,4 l/ha Banjo 500 SC är en bra lösning för att hantera bladmögel, torrfläcksjuka och resistensutveckling.

Bedöm smittrycket och blanda sen.

Vill du veta mer och få rekommendationer för din bladmögelstrategi är du välkommen att kontakta våra duktiga konsulenter.



Carl-Henrik Ljung
Mobil: 0702 35 79 03
carl-henrik.ljung@syngenta.com



Erik Jönsson
Mobil: 0733 40 78 41
erik.jonsson@syngenta.com

