


Vixeran blandbarhet


Appliceras med en vanlig växtskyddspruta. Blandningen ska appliceras samma dag. Bakterierna är aktiva från +4° C till 45° C. Den optimala marktemperaturen är 15–35° C. Vid temperaturer under fryspunkten går bakterierna i dvala, men kommer att fortsätta produktionen när temperaturen stiger igen.

Vixeran är en levande bakterie. Testet av blandbarhet är därför annorlunda än med vanliga växtskyddsmedel. Vixeran blandas med växtskyddsmedlet och om det finns en god överlevnadsförmåga hos bakterierna är blandningen godkänd.

Sprutvätska med pH 5–9 och en vattenmängd om minst 150 liter per hektar rekommenderas.



Inte blandbar



Blandbar

Bilden till vänster visar en produkt som inte är blandbar med Vixeran, det har inte skett någon bakterietillväxt och produkten har tagit död på bakterierna. Bilden till höger visar en produkt som är blandbar med Vixeran, bakterierna lever och förökar sig.

Syngenta garanterar inte att alla tankblandningar är säkra för grödan under alla existerande förhållanden orsakade av t.ex. varierande vattenkvalitet, vattentemperaturer, väder, sorter etc. Tillsätt Vixeran sist vid tankblandning med andra preparat. Blandningstest rekommenderas

Blandbar
Ally 20 SX/CDQ SX
Teppeki
Agil
Alliance
Amistar
Amistar Gold
Ariane
Ascra Xpro
ATLANTIS OD
Avoxa
Axial 50 EC
Axial One EC
Balaya
Belkar
Boxer
Broadway
Broadway Star
Callisto
Caryx 240 SL
Centium
Comet Pro
Cossack OD
Dash HC
Elatus Era
Express 50 SX
Express Gold
Flexity
Folicur Expert
Geoxe
Harmony Plus 50 SX
Hussar OD
Hussar Plus OD
Maister

Blandbar
Maister Power 42.5 OD
Mangannitrat (235 mangan)
Mangansulfat
Matrigon
Mavrik
MCPA
Moddus M
Moddus Start (A17600C)
Mustang Forte
Onyx
Orius 200 EW
ORTIVA TOP
Pictor Active
Pixxaro EC
Priaxor
Proline
Proman
Regalis Plus
REVUS
Revus Top
Rexade
Select Plus
SIGNUM
Stabilan 750 SL
Starane XL
SWITCH
Taegro
Tocalis
Trimmer SG
Trimmer WG
Vegetabilsk olja
Zypar

Inte blandbar
Aliette WG
CERONE 480 SL
Focus Ultra
Medax Max
Talius