

# Blandningstabell AXIAL 50 EC

OGRÄSMEDEL		
Alliance		Risk för antagonism när flyghavre är målogräset. När åkerven, kvickrot och renkavle m.fl är målogräs är blandning ok. Max 40 g Diflufenikan per ha i tankblandning. Observera ökad risk för vitfärgning av grödan vid behandling med Diflufenikan.
Ariane S		Viss risk för nedsatt effekt mot flyghavre vid blandning med produkter innehållande MCPA. Rekommenderas ej då högsta krav ställs på behandlingseffekten mot flyghavre vid tuffa förhållanden. Max 1,5 l Ariane S per ha.
Atlantis OD		Risk för antagonism när flyghavre är målogräset. När åkerven och renkavle m.fl är målogräs är blandning ok.
Attribut SG 70		
Broadway		
Biathlon 4D		
CDQ SX		Risk för antagonism när flyghavre är målogräset. När åkerven och renkavle m.fl är målogräs är blandning ok.
Cleave		
Duplosan-D		Viss risk för nedsatt effekt mot flyghavre vid blandning med produkter innehållande 2,4-D. Rekommenderas ej då högsta krav ställs på behandlingseffekten mot flyghavre vid tuffa förhållanden. Max 0,25 l Duplosan-D per ha.
Ergon		Risk för antagonism när flyghavre är målogräset. När åkerven och renkavle m.fl är målogräs är blandning ok.
Express 50 SX		
Flurostar 200		
Harmony Plus 50 SX		
Hussar Plus OD		Hög risk för antagonism
Kinvara		Viss risk för nedsatt effekt mot flyghavre vid blandning med produkter innehållande MCPA. Rekommenderas ej då högsta krav ställs på behandlingseffekten mot flyghavre vid tuffa förhållanden. Max 1,3 l Kinvara per ha.
Legacy 500 SC		Max 40 g Diflufenikan per ha i tankblandning. Observera ökad risk för vitfärgning av grödan vid behandling med Diflufenikan.
MCPA		Viss risk för nedsatt effekt mot flyghavre vid blandning med produkter innehållande MCPA. Rekommenderas ej då högsta krav ställs på behandlingseffekten mot flyghavre vid tuffa förhållanden. Max 0,5 l MCPA per ha.
Mustang		Viss risk för nedsatt effekt mot flyghavre vid blandning med produkter innehållande 2,4-D. Rekommenderas ej då högsta krav ställs på behandlingseffekten mot flyghavre vid tuffa förhållanden. Max 0,4 l Mustang per ha.
Mustang Forte		Viss risk för nedsatt effekt mot flyghavre vid blandning med produkter innehållande 2,4-D. Rekommenderas ej då högsta krav ställs på behandlingseffekten mot flyghavre vid tuffa förhållanden. Max 0,7 l Mustang Forte per ha.
Nautius		
Nuance		
Pixxaro		
Primus/Saracen		
Primus XL		
Quelex		
Ratio Super SX		
Saracen Delta		Max 40 g Diflufenikan per ha i tankblandning. Observera ökad risk för vitfärgning av grödan vid behandling med Diflufenikan.
Sekator OD		Hög risk för antagonism
Spitfire 333HL		
Starane 333HL		
Starane XL		
Tomahawk 200 EC		
Trimmer 50 SG		
Trimmer 500 WG		
Tripali		Risk för antagonism när flyghavre är målogräset. När åkerven och renkavle m.fl är målogräs är blandning ok.
Tombo		
Zypar		

## TILLVÄXTREGLERINGSMEDEL

BASF Cycocel Plus	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cerone	<input checked="" type="checkbox"/>	
MODDEVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
MODDUS® START	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stabilan	<input checked="" type="checkbox"/>	
Terpal	<input checked="" type="checkbox"/>	

## INSEKTSMEDEL

Inga kända blandbarhetsproblem med insekticider. Kontakta alltid tillverkaren av det aktuella medlet för mer information.

## SVAMPMEDEL

Amistar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Elatus Era	<input checked="" type="checkbox"/>	
Elatus Plus	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kayak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pecari 300	<input checked="" type="checkbox"/>	
Plexeo 90	<input checked="" type="checkbox"/>	

## BLADGÖDSELMEDEL INNEHÅLLANDE SVAVEL I FORM AV MANGASULFAT, AMMONIUMTIOSULFAT ELLER AMMONIUMSULFAT-SALPETER

Bladgödselmedel innehållande svavel i form av mangasulfat, ammoniumtiosulfat eller ammoniumsulfat-salpeter



Flytande kvävegödselmedel såsom urea eller flytande ammoniumkväve

- Blandbar enligt nuvarande kunskap
- Blandbar med risk för något nedsatt behandlingseffekt mot gräsgräsen. Om behandlingarna utförs efter varandra skall ett avstånd på minst 7 dagar mellan behandlingarna hållas.
- På grund av hög risk för skadlig påverkan på grödan skall följande produkter aldrig tankblandas med AXIAL 50 EC. Vidare bör ett intervall på minst 10 dygn mellan behandling med AXIAL 50 EC och de följande produkterna hållas för att undgå risk för skadlig påverkan på grödan.
- Tillsatsmedel som normalt krävs för fullgod effekt av produkten skall ej användas vid tankblandning med minst 0,6 l/ha AXIAL 50 EC.

Syngenta avråder från tankblandning med mer än en växtskyddsprodukt åt gången. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

Viss missfärgning eller påverkan av grödan kan förekomma vid behandlingen, särskilt vid stora temperaturskillnader mellan natt och dag, vid nattfrost, kraftig solinstrålning etc., eller när grödan har ett mycket tunt vaxskikt eller under blöta förhållanden. Detta påverkar inte skörden under normala förhållanden. Vissa tankblandningar ökar risken för påverkan på grödan.

Syngenta garanterar inte att alla produkterna ovan kan tankblandas fysikalskt eller är säkra för grödan under alla förekommande förhållanden som orsakas av exempelvis varierande vattenkvalitet, vattentemperaturer, väder, sorter etc.

Tillsätt alltid fasta produkter först i spruttanken.

Påbörja spridningen av sprutvätskan så snart tankblandningen är klar. Håll sprutvätskan i kontinuerlig omrörning tills arbetet är avslutat.

### Produkterna ovan är registrerade varumärken hos

Bayer	Attribut SG 70, Atlantis OD, Sekator OD, Hussar Plus OD, Cerone
BASF	Biathlon, Cycocel Plus, Medax Max, Terpal
Adama	Cleave, Legacy, Trimmer 500 WG, Trimmer 50 SG, Tomahawk 200
FMC	CDQ, Express, Harmony Plus 50SX, Tripali
Nufarm	Alliance, Duplosan D, MCPA, Saracen, Saracen Delta, Nuance, Stabilan
Corteva	Ariane S, Mustang, Mustang Forte, Primus, Primus XL, Spitfire 333HL, Starane 333HL, Starane XL, Zypar, Broadway, Tombo, Quelex, Pixxaro
Nordisk Alkali	Kinvara, Ergon, Flurostar 200, Nautius

 **Axial® 50 EC**

 **syngenta®**