



Elatus™ Plus

syngenta®

GROUP **7** FUNGICIDE

SVAMPMEDEL

SVAMPMEDEL

Mot svampsjukdomar i odlingar av vår- och höstvet, vår- och höstkorn, råg och rågvete.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs medföljande anvisningar före användningen.

Detta växtskyddsmedel får endast tillhandahållas till distributörer och yrkesmässiga användare som har ett giltigt utbildningsbevis.



Läs Syngentas allmänna rekommendationer för säker användning av växtskyddsmedel.
www.zero-impact.syngenta.se

Läs alltid etiketten innan användning och följ den.
Var uppmärksam på varningar och symboler.

L1122480 SWED/07C PPE 4212757

5 L

Product names marked © or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

**FARA**

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

H302 Skadligt vid förtäring.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Mot svampsjukdomar i odlingar av vår- och höstvete, vår- och höstkorn, råg och rågvete.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Behandling får i vete, råg och rågvete ej ske senare än vid avslutande blomning (utvecklingsstadie 69) och i korn ej senare än begynnande blomning (utvecklingsstadie 59).

P261 Undvik att andas sprej.

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.

P391 Samla upp spill.

P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

+P312

P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

+P338

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

UFI: D94A-90KU-500M-S16T

SVAMPMEDEL

Reg. Nr. 5315

Behörighetsklass 2L

Endast för yrkesmässigt bruk

Net innehåll: 5 L

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tel 0771-24 48 10

Beredningsform: Emulgerbart koncentrat

**Innehåller: Bensovindiflupyr 100 g/l (10,2% w/w)
N,N-Dimetyldekanamid**



5 707239 502668

BRUKSANVISNING
GODKÄND ANVÄNDNING

Mot svampsjukdomar i odlingar av vår- och höstvetete, vår- och höstkorn, havre, råg och rågvetete. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Skyddsavstånd

Avdriftsreducerande utrustning, som reducerar avdriften med minst 50 % ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska de vindanpassade skyddsavstånden bestämmas genom avläsning i kolumnen för grov duschkvalitet.

GRÖDOR, DOSERING OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

GRÖDA	SKADEGÖRARE	DOSERING (l/ha)	ANMÄRKNING
Vete BBCH 31-69	Rost (<i>Puccinia spp.</i>) Svartpricksjuka (<i>Septoria tritici</i>) Brunfläcksjuka (<i>Septoria nodorum</i>)	0,38-0,75	Vattenmängd (l/ha): 100-400 Max 1 behandling/säsong
Korn BBCH 31-59	Kornets bladfil (<i>Pyrenophora teres</i>) Ramularia (<i>Ramularia collo-cygni</i>) Rost (<i>Puccinia hordei</i>) Sköldfläcksjuka (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0,38-0,75	Vattenmängd (l/ha): 100-400 Max 1 behandling/säsong
Råg BBCH 31-69	Rust (<i>Puccinia recondite</i>) Sköldfläcksjuka (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0,38-0,75	Vattenmängd (l/ha): 100-400 Max 1 behandling/säsong
Rågvetete BBCH 31-69	Rost (<i>Puccinia spp.</i>) Svartpricksjuka (<i>Septoria tritici</i>) Brunfläcksjuka (<i>Septoria nodorum</i>) Sköldfläcksjuka (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0,38-0,75	Vattenmängd (l/ha): 100-400 Max 1 behandling/säsong
Havre BBCH 31-59	Rost (<i>Puccinia coronata</i>)	0,38-0,75	Vattenmängd (l/ha): 100-400 Max 1 behandling/säsong

OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN
Svamputveckling

Elatus™ Plus skall användas förebyggande. En jämn och god täckning av grödan är en förutsättning för fullgod effekt.

Grödan

Spannmålen måste vara i god tillväxt och inte hämmad av torka eller tidigare sprutningar.

VERKNINGSSÄTT OCH VERKNINGSMEKANISM

Elatus™ Plus innehåller den aktiva substansen bensovindiflupyr. Bensovindiflupyr (Solatenol™) tillhör gruppen SDHI-fungicider som inhiberar Complex II-respiration. Solatenol™ verkar förebyggande. Solatenol™ fördelas jämnt mellan bladyta, vaxlager och bladvävnad. Denna fördelning och den aktiva substansens höga molekylära aktivitet gör att Solatenol™ ger en effektiv sjukdomskontroll

TANKBLANDING

Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

BEHANDLINGSTEKNIK, RENGÖRING MM

Personlig skyddsutrustning

Vid hantering av produkten eller sprutväskan ska skyddshandskar och ögonskydd användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.

Beredning av sprutväskan

Blanda inte mer sprutväska än vad som åtgår vid behandlingen. Fyll tanken till hälften med vatten. Tillsätt preparaten var för sig och resten av vattnet under omrörning. Sprutväska ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete. Använd alltid skyddsutrustning vid hantering av koncentrerat preparat och sprutväska. Koncentrerat preparat eller sprutväska får under inga omständigheter komma ut i avlopp, åar eller vattentäcker.

Rengöring av sprututrustning

1. Rengör sprututrustningen ut- och invändigt omedelbart efter användning med rent vatten i fält.
2. Skölj tanken invändigt med rent vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning, t ex All Clear™ Extra. Spruta ut sköljvattnet i fält. Läs alltid produktens bruksanvisning före användning.
3. Skölj sprututrustningen med vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning. Slangar, munstycken, ventiler och filter skall genomsköljas och tanken skall stå under omrörning i minst 25 minuter. Filter och munstycken rengörs också separat i vatten med tillsats av medel avsett för rengöring av sprututrustning. Denna rengöring bör ske på säker plats, t ex biobädd eller behandlad mark/gröda. Sköljvatten får under inga omständigheter förorena avlopp, brunnar, åar, dammar etc.

Avfall och tomemballager

Förpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder.

Kontrollera att inga rester av preparatet finns kvar i dunken. Rengjorda förpackningar lämnas till SvegReturs samlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Tom förpackning får inte återanvändas.

OMSÅDD, EFTERFÖLJANDE GRÖDOR

Inga restriktioner.

RESISTENS

Bensovindiflupyr (Solatenol™) tillhör FRAC grupp 7, vilken har medelhög till hög risk för att utveckla resistens.

Elatus™ Plus bör användas i sprutprogram med annan produkt som har god effekt mot de sjukdomar som man vill bekämpa, men som tillhör en annan resistensgrupp.

Elatus™ Plus bör användas förebyggande för att minska risken för utveckling av resistens mot SDHI-fungicider.

Upprepade behandlingar med medel med samma verkningsmekanism ökar risken för utveckling av resistens. För att minska risken får produkter med Solatenol™ användas max 1 gång per säsong.

OPBEVARING

Frostfritt

ATT BEAKTA

Syngenta är ansvarig för att produkten har den sammansättning, som är anmäld till myndigheterna, såvida den finns i originalförpackning, lagras och används enligt etikett. Syngenta fråntar sig allt ansvar för produktens effekt samt skador, även följskador, som uppstått genom felaktig lagring och användningssätt.

Var uppmärksam på att faktorer såsom väder, markförhållanden, sorter, resistens, behandlingsteknik kan påverka produktens effekt.

För mer information om produkten se vår hemsida www.syngenta.se

Syngentas allmänna rekommendationer för säker användning av växtskyddsmedel



Användning av avdriftsreducerande munstycken = Minimering av avdrift och avdunstning
Använd bästa tillgängliga spruteteknik för att minimera risken för avdrift från fältet.



Säker rengöring av sprututrustning = Inga onödiga skador på andra grödor eller miljön
Resterna av bekämpningsmedel i tanken späds ut 1:100 gånger och sprutas över den behandlade grödan. Efteråt rengörs spruta, munstycken och bom på fältet eller på tvättområdet.



Bra bo- och matplatser för insekter i naturen = Ökad biologisk mångfald
Se till att det inte sker avdrift eller spill i naturen när du gödslar eller besprutar – till exempel genom att hålla avstånd.



Inga bin = Ingen pollinering
Bin och andra pollinatörer kan skyddas från växtskyddsprodukter som är skadliga för dem genom att spruta vid tidpunkter på dygnet då pollinatörer inte befinner sig i fält, eller spruta enbart i fält där ingen blommande vegetation förekommer.



Ansvarsfull användning av produkter = Ökad säkerhet
God hygien och användning av lämplig säkerhetsutrustning skyddar dig och din omgivning.

Läs alltid etiketten innan användning och följ den. Var uppmärksam på varningar och symboler.

Good Growth Plan | **syngenta**



Läs mer på zero-impact.syngenta.se

Registrerade varumärken

Syngenta Group Company: Solatenol™, Elatus™ Plus