

**FARA****EUH401** För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsaker allvarliga ögonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Mot svampsjukdomar i odlingar av vår- och höstvede, vår- och höstkorn, råg, rågvete, havre, torra ärter, kikärter, linser och bönor samt lin.**All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.****Behandling får i vete, råg och rågvete ej ske senare än vid avslutande blomning (utvecklingsstadie 69), i korn och havre ej senare än begynnande blomning (utvecklingsstadie 59) och in i ärter, linser och bönor ej senare än utvecklingsstadie 72. I lin ej senare än utvecklingsstadie 69.****P261** Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.**P280** Använd skyddshandskar och ögonskydd.**P403+P233** Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.**P501** Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.**SP1** Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag.**P304+P340** VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.**+P312** Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.**P305+P351** VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.**+P338+P310** Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp**P337+P313** Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp**P391** Samla upp spill.

Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

UFI: 8QFS-5537-T007-X51G

Reg. Nr. 5321

Behörighetsklass 2L

Endast för yrkesmässigt bruk

Net innehåll: 5 L

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S, Danmark,

Tel 0771-24 48 10

Beredningsform: Emulgerbart koncentrat

Innehåller:

Bensovindiflupyr 75 g/l (7,43% w/w),

Protiokonazol 150 g/l (14,9% w/w),

N,N-Dimetyldekanamid



5 707239 502521

BRUKSANVISNING
GODKÄND ANVÄNDNING

Mot svampsjukdomar i odlingar av vår- och höstvetete, vår- och höstkorn, råg, rågvete, havre, torra ärter, kikärtor, linser och bönor samt lin.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Skyddsavstånd

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpredda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

GRÖDOR, DOSERING OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

GRÖDA	SKAPEGÖRARE	DOSERING (l/ha)	ANMÄRKNING
Vete BBCH 31-69	Rost (<i>Puccinia spp.</i>) Svartpricksjuka (<i>Septoria tritici</i>) Brunfläcksjuka (<i>Septoria nodorum</i>) <i>Fusarium spp.</i>	0,5-1,0 1,0	Vattenmängd (l/ha): 100-400 Max 1 behandling/säsong
Korn BBCH 31-59	Kornets bladfläcksjuka (<i>Pyrenophora teres</i>) Ramularia (<i>Ramularia collo-cygni</i>) Rost (<i>Puccinia horde</i>) Sköldfläcksjuka (<i>Rhynchosprum secalis</i>)	0,5-1,0	Vattenmängd (l/ha): 100-400 Max 1 behandling/säsong
Råg BBCH 31-69	Rost (<i>Puccinia recondite</i>) Sköldfläcksjuka (<i>Rhynchosprum secalis</i>)	0,5-1,0	Vattenmängd (l/ha): 100-400 Max 1 behandling/säsong
Rågvete BBCH 31-69	Rost (<i>Puccinia spp.</i>) Svartpricksjuka (<i>Septoria tritici</i>) Brunfläcksjuka (<i>Septoria nodorum</i>) Sköldfläcksjuka (<i>Rhynchosprum secalis</i>)	0,5-1,0	Vattenmängd (l/ha): 100-400 Max 1 behandling/säsong
Havre BBCH 31-59	Rost (<i>Puccinia spp.</i>) Bladfläcksjuka (<i>Pyrenophora avenae</i>)	0,5-1,0	Vattenmängd (l/ha): 100-400 Max 1 behandling/säsong
Torra ärter, kikärtor, linser och bönor BBCH 51-72	Ascochyta sp Rost (<i>Uromyces sp.</i>) <i>Botrytis sp.</i>	0,66	Vattenmængd 100-600 l/ha Max 1 behandling/säsong
Lin BBCH 32-69	Linprick (<i>Septoria sp.</i>) Mjöldagg (<i>Golovinomyces orontii</i>)	0,66	Vattenmængd 100-400 l/ha Max 1 behandling/säsong

OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN
Svamputveckling

ELATUS™ Era skall användas förebyggande. En jämn och god täckning av grödan är en förutsättning för fullgod effekt.

Grödan

Spannmålen måste vara i god tillväxt och inte hämmad av torka eller tidigare sprutningar.

VERKNINGSSÄTT OCH VERKNINGSMEKANISM

ELATUS™ Era innehåller de aktiva substanserna bensovindiflupyr och protikonazol som har två olika verkningsmekanismer.

Bensovindiflupyr (SOLATENOL™) tillhör gruppen SDHI-fungicider, vilka inhiberar Complex II-respirationen. SOLATENOL™ verkar förebyggande. SOLATENOL™ fördelas jämnt mellan bladytta, vaxlager och bladdävnad. Denna fördelning och den höga molekylära aktiviteten gör att SOLATENOL™ ger en effektiv sjukdomskontroll.

Protiokonazol tillhör gruppen triazolol och verkar systemiskt, med både preventiv och kurativ effekt.

TANKBLANDING

Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

BEHANDLINGSTEKNIK, RENGÖRING MM

Personlig skyddsutrustning

Vid hantering av produkten eller sprutväska ska skyddshandskar och ögonskydd användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.

Vid återinträde i behandlade områden skal arbetskläder (som täcker armer, ben och bål) får användas för den återstående varaktigheten av grödans livscykel. Andre hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd

Beredning av sprutvätskan

Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Fyll tanken till hälften med vatten. Tillsätt preparaten var för sig och resten av vattnet under omrörning. Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete. Använd alltid skyddsutrustning vid hantering av koncentrerat preparat och sprutvätska. Koncentrerat preparat eller sprutvätska får under inga omständigheter komma ut i avlopp, åar eller vattentätkter.

Rengöring av sprututrustning

1. Rengör sprututrustningen ut- och invändigt omedelbart efter användning med rent vatten i fält.
2. Skölj tanken invändigt med rent vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning, t ex All Clear™ Extra. Spruta ut sköljvattnet i fält. Läs alltid produktens bruksanvisning före användning.
3. Skölj sprututrustningen med vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning. Slangar, munstycken, ventiler och filter skall genomsköljas och tanken skall stå under omrörning i minst 25 minuter. Filter och munstycken rengörs också separat i vatten med tillsats av medel avsett för rengöring av sprututrustning. Denna rengöring bör ske på säker plats, t ex biobädd eller behandlad mark/gröda. Sköljvattnet får under inga omständigheter förorena avlopp, brunnar, åar, dammar etc.

Avfall och tomemballage

Förpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. Kontrollera att inga rester av preparatet finns kvar i dunken. Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se. Tom förpackning får inte återanvändas.

Inga restriktioner.

RESISTENS

Blandningen av SDHI SOLATENOL™ och triazolen protikonazol med olika verkningsmekanismer fungerar som en effektiv resistensstrategi. SOLATENOL™ tillhör FRAC grupp 7, vilken har medelhög till hög risk för att utveckla resistens, medan protikonazol tillhör FRAC grupp 3, som har medelhög risk för att utveckla resistens.

Det finns ingen korsresistens mellan de två fungicidgrupperna.

ELATUS™ Era skall användas förebyggande för att minska risken för utveckling av resistens mot SDHI-fungicider.

Upprepade behandlingar med medel med samma verkningsmekanism ökar risken för utveckling av resistens. För att minska risken får produkter med SOLATENOL™ användas max 1 gång per säsong. Risken för resistens hos fungicider kan minskas genom behandling tidigt i infektionsförloppet.

OPBEVARING

Frostfritt

ATT BEAKTA

Syngenta är ansvarig för att produkten har den sammansättning, som är anmäld till myndigheterna, såvida den finns i originalförpackning, lagras och används enligt etikett. Syngenta fråntar sig allt ansvar för produktens effekt samt skador, även följskador, som uppstått genom felaktig lagring och användningssätt.

Var uppmärksam på att faktorer såsom väder, markförhållanden, sorter, resistens, behandlingsteknik kan påverka produktens effekt.

För mer information om produkten se vår hemsida www.syngenta.se

Syngentas allmänna rekommendationer för säker användning av växtskyddsmedel



Användning av avdriftsreducerande munstycken = Minimering av avdrift och avdunstning
Använd bästa tillgängliga spruteteknik för att minimera risken för avdrift från fältet.



Säker rengöring av sprututrustning = Inga onödiga skador på andra grödor eller miljö
Resterna av bekämpningsmedel i tanken spåds ut 1:100 gånger och sprutas över den behandlade grödan. Efteråt rengörs spruta, munstycken och bom på fältet eller på tvättområdet.



Bra bo- och matplatser för insekter i naturen = Ökad biologisk mångfald
Se till att det inte sker avdrift eller spill i naturen när du gödslar eller besprutar – till exempel genom att hålla avstånd.



Inga bin = Ingen pollinering
Bin och andra pollinatörer kan skyddas från växtskyddsprodukter som är skadliga för dem genom att spruta vid tidpunkter på dygnet då pollinatörer inte befinner sig i fält, eller spruta enbart i fält där ingen blommande vegetation förekommer.



Ansvarsfull användning av produkter = Ökad säkerhet
God hygien och användning av lämplig säkerhetsutrustning skyddar dig och din omgivning.

Läs alltid etiketten innan användning och följ den. Var uppmärksam på varningar och symboler.

Good Growth Plan | **syngenta**.



Registrerade varumärken

Syngenta Group Company: SOLATENOL™, ELATUS™ Era