

**VARNING****EUH401**

H302

H319

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skadligt vid förtäring.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Mot svampangrepp i växthusodlingar av rädisor, kepalök, gurka, sallat, broccoli, blomkål, brysselkål, vitkål, kårabbi, dill, och persilja genom betning av utsäde.**Frön som behandlats med Apron XL får endast säas i växthus.****All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.****Behandlat utsäde skall efter behandling omedelbart emballeras och plomberas.****Behandlat utsäde får ej användas som foder eller livsmedel.**

P270

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P280

Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

SP1

Förerena inte vatten med produkten eller dess behållare.

P301+P312

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P305+P351+P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P330

Skölj munnen.

P337+P313

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

Reg nr 5635**Behörighetsklass 2L Endast för yrkesmässigt bruk****Beredningsform: Emulsion för betning av utsäde****Innehåller: Metalaxyl-M 339 g/l (32% w/w)****Net innehåll: 20 L**

BRUKSANVISNING**GODKÄND ANVÄNDNING**

Mot svampangrepp i växthusodlingar av rädisor, kepalök, gurka, sallat, broccoli, blomkål, brysselkål, vitkål, kålrabbi, dill, och persilja genom betning av utsäde.

Frön som behandlats med Apron XL får endast sås i växthus.

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Omfatter inte tunnelodling.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

GRÖDOR, DOSERING OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

GRÖDA	DOSERING
Broccoli, brysselkål, vitkål, blomkål, kålrabbi	25-200 ml/100 kg utsäde*
Dill, persilja	50-200 ml/100 kg utsäde*
gurka, sallat, kepalök, rädisa	50-100 ml/100 kg utsäde*

* Skall spädas med vatten upp till motsvarande minst 200 ml/100 kg utsäde

OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN

Behandlingen skall ske i anläggningar ägnade för ändamålet och som ger en optimal fördelning av produkten på kärnorna. Fröet skall vara av god kvalitet, väl rensat och fritt från damm och andra föroreningar. Behandling med Apron[®] XL påverkar inte utsädet lagringsstabilitet. Behandlingen bibehåller sin effektivitet under hela lagringsperioden eller under minst två år.

VERKNINGSSÄTT OCH VERKNINGSMEKANISM

Apron[®] XL innehåller den systemiska och selektiva fungiciden metalaxyl-M i en vattenbaserad formulering. Metalaxyl-M är en enantiomer och består av den aktiva delen av metalaxyl. Mängden aktiv substans har härmed kunnat halveras. Metalaxyl-M tillhör gruppen fenylamider. Produkten är speciellt utformad för behandling av utsäde mot frö- och markburen smitta.

Verkan på svamparna sker genom påverkan på ribonukleinsyntesen.

Apron[®] XL tas upp av det groende fröet och transporteras systemiskt både i blad och rötter under groningen. Detta ger skydd för plantan från groningen och fram till strax efter uppkomst mot Pythium och frö- och markburen bladmögel. Dessutom erhålls skydd mot luftburen smitta av bladmögel. Även grobarheten har i praktiska behandlingar visat sig förbättras vid förekomst av fröburen smitta.

Apron[®] XL innehåller vidhäftningsmedel för att erhålla god vidhäftning vid utsädet. Erfarenhet har visat att linjer av svampar är resistenta mot metalaxyl-M kan utvecklas.

Detta kan resultera i en minskning av produktens effekt och därmed risk för skördebortfall. Då resistens inte kan förutses tar Syngenta inget ansvar för skador eller skördebortfall som har orsakats av bristande effekt av Apron[®] XL vad gäller kontroll av resistenta linjer.

TANKBLANDING

Apron® XL kan blandas med de flesta genuint vattenbaserade samt pulverformulerade preparat.

OBS! Att en produkt innehåller vatten innebär inte att denna är vattenbaserad. En produkt kan innehålla andra lösningsmedel och vara icke blandbar med Apron® XL. För råd kontakta Syngenta.

Vid blandning med pulverformade preparat kan dessa uppslmmas direkt i Apron® XL. Blandningens konsistens avgör om behov av vattentillsats föreligger.

BEHANDLINGSTEKNIK, RENGÖRING MM

Apron® XL är fullständigt vattenlöslig och kan därmed spädas med vatten efter behov. Apron® XL kan appliceras på utsådet i de flesta utrustningar avsedda för behandling av våttyp. För att erhålla bästa möjliga resultat rekommenderas utrustning med efterblandare av skruttyp. För bästa möjliga resultat rekommenderas vidare att Apron® XL spädas med vatten i förhållande minst 1:1 för en säkrare fördelning av preparatet. Behovet av spädning med vatten innebär att applikationsprocessen måste ske under frostfria förhållanden.

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar ska användas vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid kalibrering och rengöring av betningsmaskin. Vid hantering av betat utsåde ska skyddshandskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Rengöring av behandlingutrustning

Utrustningen genomspolas med vatten. Sköljvattnet skall förvaras i väl tillslutna behållare och kan blandas med preparatet vid nästa behandlingstillfälle.

Sköljvatten förorenat med annat än Apron® XL, eller som ej återanvänds tillsammans med preparat, är farligt avfall och lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

Avfall och tomemballage

Förpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i tanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se. Syngenta är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85 samt till REPA tel 0200- 88 03 10. Preparatrest, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är farligt avfall och lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

Tom förpackning får inte återanvändas.

Märkning av utsådesförpackning

Förpackningar med behandlat utsåde skall märkas enligt förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Emballage skall som minimum märkas med:

BETAT i Sverige med

Apron® XL

(verksam beståndsdel: Metalaxyl-M) Reg nr 5635, behörighetsklass 2L

Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten (P270).

Använd ögonskydd/ansiktsskydd (P280). VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta

GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare (P301+P312).

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja (P305+P351+P338).

Skölj munnen (P330).

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp (P337+P313).

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare (P501). Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare (SP1). Vid hantering av betat utsåde ska skyddshandskar användas.

Betat utsåde får inte användas till mat eller foder. Förpackningen ska hanteras som farligt avfall.

Inga restriktioner.

RESISTENS

Apron® XL innehåller den aktiva substans metalaxyl-M som tillhör gruppen fenylamider (FRAC grupp 4). Eftersom betningsmedel används bara en gång, är det uppskattat att risken för resistensutveckling är låg. För att minska risken för resistensutveckling, bör rekommenderade dosen användas.

OPBEVARING

Behandling med Apron® XL påverkar inte utsädes lagringsstabilitet. Behandlingen bibehåller sin effektivitet under hela lagringsperioden eller under minst två år.

ATT BEAKTA

Syngenta är ansvarig för att produkten har den sammansättning, som är anmäld till myndigheterna, såvida den finns i originalförpackning, lagras och används enligt etikett. Syngenta frångår sig allt ansvar för produktens effekt samt skador, även följdskador, som uppstått genom felaktig lagring och användningsätt. Var uppmärksam på att faktorer såsom väder, markförhållanden, sorter, resistens, behandlingsteknik kan påverka produktens effekt.

För mer information om produkten se vår hemsida www.syngenta.se

Syngentas allmänna rekommendationer för säker användning av växtskyddsmedel



Läs mer på zero-impact.syngenta.se



Användning av avdriftsreducerande munstycken = Minimering av avdrift och avdunstning
Använd bästa tillgängliga spruteteknik för att minimera risken för avdrift från fältet.



Säker rengöring av sprututrustning = Inga onödiga skador på andra grödor eller miljö
Resterna av bekämpningsmedel i tanken spåds ut 1:100 gånger och sprutas över den behandlade grödan. Efteråt rengörs spruta, munstycken och bom på fältet eller på tvättområdet.



Bra bo- och matplatser för insekter i naturen = Ökad biologisk mångfald
Se till att det inte sker avdrift eller spill i naturen när du gödslar eller besprutar – till exempel genom att hålla avstånd.



Inga bin = Ingen pollinering
Bin och andra pollinatörer kan skyddas från växtskyddsprodukter som är skadliga för dem genom att spruta vid tidpunkter på dygnet då pollinatörer inte befinner sig i fält, eller spruta enbart i fält där ingen blommande vegetation förekommer.




Ansvarsfull användning av produkter = Ökad säkerhet
God hygien och användning av lämplig säkerhetsutrustning skyddar dig och din omgivning.

Läs alltid etiketten innan användning och följ den. Var uppmärksam på varningar och symboler.

Good Growth Plan | **syngenta**

Registrerade varumärken
Syngenta Group Company: Apron®



 **Apron[®] XL**

L1070772 SWED/12Y PPE 4132280

SVAMPMEDEL



VARNING

EUH401

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

H302

Skadligt vid förtäring.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Mot svampangrepp i växthusodlingar av rödisor, kepalök, gurka, sallat, broccoli, blomkål, brysselkål, vitkål, kålrabbi, dill, och persilja genom betning av utsäde.

Frön som behandlats med Apron XL får endast sås i växthus.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Behandlat utsäde skall efter behandling omedelbart emballeras och plomberas.

Behandlat utsäde får ej användas som foder eller livsmedel.

P270

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P280

Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

SP1

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

P301+P312

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P305+P351+P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

P330

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337

Skölj munnen.

P337+P313

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

Reg nr 5635

Behörighetsklass 2L Endast för yrkesmässigt bruk

Beredningsform: Emulsion för betning av utsäde

Innehåller: Metalaxyl-M 339 g/l (32% w/w)

Net innehåll: 20 L

Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S, Danmark. Tel 0771-24 48 10



5 707239 500046