

FÅ BÄTTRE EFFEKT OCH MINIMIERA RISKEN FÖR AVDRIFT AV JORDHERBICIDER, I SYNNERHET PROSULFOCARBMEDEL

BAKGRUND


Med bakgrund av följande är det av yttersta vikt att tänka på sprut-teknik vid användning av prosulfocarbprodukter för att få optimal effekt av produkt och undvika avdrift.

Prosulfocarb är en aktiv substans som framförallt används som en herbicid i spannmål, potatis och frögräs. I Sverige finns idag 5 stycken herbicider registrerade där prosulfocarb ingår som aktiv substans: Boxer®, Purelo®, Roxy/PRO-opti* och Jura®.

*Registrerade varumärken: Globachem NV: Roxy® 800 EC; PRO-opti; Jura®



SÅ GÖR DU FÖR ATT PÅ BÄSTA SÄTT FÖREBYGGA AVDRIFT – OCH FÅR BÄSTA EFFEKT



MUNSTYCKE

- ▶ Använd grov duschkvalitet för att minska avdrift
- ▶ Minimum 75%, gärna 90%, avdriftsreducerande munstycke rekommenderas
- ▶ Munstycken ISO 025, ISO 03 och ISO 04 är ett bra val




FUKT

- ▶ Spruta när luftfuktigheten är hög
- ▶ Markytan ska vara lätt fuktig



OPTIMAL SPRUTTIDPUNKT

- ▶ På kvällen efter solnedgång
- ▶ På natten



SPRUTNING

- ▶ Kör långsamt: max 6-8 km/h
- ▶ Använd låg bomhöjd: max 50 cm
- ▶ Använd stor mängd vatten: minst 200 liter/ha
- ▶ Sänk hastigheten ytterligare vid körning i kanten av fältet



VÄDER

- ▶ Svalt väder, gärna molnigt och eventuellt lätt regn. (Kraftig nederbörd, torr, varmt, blåsigtt väder eller nattfrost är inte bra).



TEMPERATUR

- ▶ Spruta vid temperaturer under 15°C



VAR UPPMÄRKSAM PÅ

- ▶ Om du har marker i närheten av fruktodlare och grönsaksodlare.
- ▶ Överväg om du kan vänta med att spruta till efter att frukter och grönsaker har skördats.
- ▶ Prata med fruktodlaren och grönsaksodlaren om den bästa spruttidpunkten.



VIND

- ▶ Max 3 m/s
- ▶ Håll koll på vindriktningen